


COMO RECONOCER A UNA SERPIENTE VENENOSA



SERPIENTES VENENOSAS DE CÓRDOBA

(Guía para Médicos)

YARARÁ CHICA *Bothrops neuwiedi*



PRIMEROS SÍNTOMAS

Acción local intensa que progresa: dolor, edema, cianosis. Trastornos de coagulación, luego pueden sobrevenir hemorragias.

TRATAMIENTO

Realizar tratamiento coadyuvante con corticoides y antihistamínicos. Inocular por vía endovenosa (preferentemente) o intramuscular antiveneno (suero antiofídico) específico



VÍBORA DE LA CRUZ *Bothrops alternatus*



PRIMEROS SÍNTOMAS

Acción local intensa que progresa: dolor, edema, cianosis. Trastornos de coagulación, luego pueden sobrevenir hemorragias.

TRATAMIENTO

Realizar tratamiento coadyuvante con corticoides y antihistamínicos. Inocular por vía endovenosa (preferentemente) o intramuscular antiveneno (suero antiofídico) específico



YARARÁ ÑATA *Bothrops ammodytoides*



PRIMEROS SÍNTOMAS

Acción local intensa que progresa: dolor, edema, cianosis. Trastornos de coagulación, luego pueden sobrevenir hemorragias.

TRATAMIENTO

Realizar tratamiento coadyuvante con corticoides y antihistamínicos. Inocular por vía endovenosa (preferentemente) o intramuscular antiveneno (suero antiofídico) específico



CASCABEL *Crotalus durissus*



PRIMEROS SÍNTOMAS

Acción local leve. Veneno de acción hemolítica y neurotóxica: dolor, diplopía, parálisis musculares con tendencia a la generalización

TRATAMIENTO

Realizar tratamiento coadyuvante con corticoides y antihistamínicos. Inocular por vía endovenosa antiveneno (suero antiofídico) específico



CORAL *Micrurus pyrrhocryptus*



PRIMEROS SÍNTOMAS

Acción local leve. Manifestaciones generales muy intensas. Parálisis musculares precoces, tipo "curarización" que dominan el cuadro.

TRATAMIENTO

Realizar tratamiento coadyuvante con corticoides y antihistamínicos. Inocular por vía endovenosa antiveneno específico. El envenenamiento por coral es de muy rápida evolución.

